EL MANOR TO SE SO 243Mtp1 Epinou Vass3R14s086-090 Collection Vassal-Montpellier Epinone 3 RM 186.90













Désignation ! Epinou

Clos Planche 10 Côté S Nº 103 ;

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité:

e de mâturité:

1) VI

5-1

PR: 0

(1) h 12-9-1958 PR=0

Epinou

Désignation :

Clos Planche Moate S No 103

Vigueur : 1

Charge :

mort by

3 3

45

54

mir le (25.8.59)

Désignation: Eaubard

Clos Planche 10 Côté S Nº 103

Vigueur : 1

Charge :

s. X
3 A
ailles p4

Anné	se 1957		E pu	nou			Côté .	1051	03
	! [Ncmbre ! tctal	146-3	49,3	: 21/3	D A T	E S	!	I 1	
1 1 1 x 5	1.1.	1.	3.	1					
TV2 Dle 20-3-57									

Ejinou

Année 1959

	Nombre	}					מ	A	T									
	! Total	25-3	1		1		! 1		6			1		1		1		
Y	1 4 =	3 3	1	ø .	1 1 1	y.	1 1	3	1	9	P	1 1		1 1		1	u	a
X	1	1 4 9	1 .	a	1 .	0	1 0	ø	1	0	12	1 =	U	1 .	¢	i	7	.0
3	1 4 .	1.1.	i .		1 .	U	! ! .	29	-	4	Þ	1 .	0	1 ,	>	1		٠
4	.4.	1 . 2.	1 .	9	1 .	V	1 .	£4	1	u	P	1 2	۵	1 .	£	1	,	4
5	1 .4.	1.3.	1 .		1 0	۵	1 .	۵	!	a	V	1		I a	٠	1	0	be.
	1	1	1		1		1		1			1		1		1		

0 & 25-3-59

Année : 1960

Nº . Epinom . . Planche do 5103. . Côté. . .

	! Nombre!! tctal!		DATES									
	1	12.3	16/3	1	!	!!!!	!					
1 2	1		!	!		!!!!	1					
2	!	!	!!!!!	!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!	1					
3	3	Λ	24	1	!!!!	! !	}					
4	2	0	1	!	!!!!	! !						
5	3	٩	1321	! 00	16-3-60x	! !	}					
Acres or one were sample regard group district a	!		i	De	16-2-008	! !	ì					

ANNEE 1989 Epinou 024301

EMPLACEMENT 3 RAH & 86-30

Souche	Nbre yeux	Débou:	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v		Maturité
1 2 3 4 5	2 22000			00	0							
Por	urritu	re:	1	Mill.	â	Port	· Mu	erig	2	Vigue	ır :	2

ANNEE 1992

Auvergne

MOM

0 24301 Epinou

EMPLACEMENT 3 R 14 186.90

		-youru								
Souche	Nbre	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison début mi/f			raison mi/v		Matoxité
1 2	2		2	1	20.5 23.5	27,5	217	26,7	29,7	
3 % 4 5 §	2		1 ^	Pour :	: $G - M - P$ Mil. TG - G - M - disc-sph-el.	1 : - P D	<u>im</u> :		cité:	: L M -C
				Saveur Pépins	r : B-Gr-Rs-	Rg-N r - f	Jus ox - he	: inc	- 00	oloré
				Port :		<u>V.</u>	igueur	*		

ANNEE: 1996

HOM Epinou BMPLACESTITE 3 R16 186, 90

050	+3.05			¥-1						_	CHANGE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF
puche	Nbre yeux		rremont mi/déb		Ferti- lité		raison mi/f		raison mi/v		Maturité
1 2	2	18.3	22,3 4	0							
3		22.3			Pour : Baie : Couleu	TG - : disc-: r : R-0 : s - : avec	Mil: 3 - M - sph-el: Gr-Rs-L m - a	$ \begin{array}{ccc} 1 & : & \\ - & P & D \\ 1 - ov - o \\ Rg - N & \\ x & - & fo \\ yrene \end{array} $	/l-fus : inc		L - M -C

EE							
EMPERICEEPEN 3 R14 186-30							
"Taturité							
THE STATE ASSESSED OF THE ELECTRICAL PROPERTY OF							
17 .03							
17:8							
-							
I 11 -C.							
loré							

Désignation : Epinou

VASSAL Planche 10 Côté S Nº 103 Souche 12345

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux (8) cotonneux 9 .
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT presque Transparentes

- 31 étalées 🐬 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Désignation :

VASSAL Planche 40 ceté S Nº 103 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 épancui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 étalées 7 en gouttière (8) autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanche 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré earminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tiret 10-5-57

Nº ordre

Désignation : Epunou

VASSAL Planche 10 côté \$ No 103 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 6 duveteux 8 cotonneux 9:
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 ·
- 28 à lobes: plan 1 ligen gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement 1 sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9 ·
- 33 entièrement 🛈 partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorés 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 7 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

C.Samson El.5,54

No ordre

Designation : E punou

VASSAL Planche 10 côté S Nº 103 souche 1 2 3 45

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3

ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds: dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre colofe (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille: verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : male 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Landier 14-6-55

N° ordre

Désignation

VASSAL planche (0 côté S N° 103 souche 1 2 3 4 5)

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
 - aranéeux 7 dimbe: glabre 4 séteux 5 velouté 6 diveteux 8 cotonneux 9
- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
- face inférieure: verte 1 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 vert franc 2 vert foncé 3 vert plombé 4 autre 5

PETIOLE

- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) •

Twet 1.1.56

Nº ordre

Cpinou Désignation

VASSAL planchedo côté 5 Nodo 3 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

aranéeux 7 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté(3.) révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan) en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2)partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long (1) - moyen 2 - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle péticle/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/ramau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Tuet 22-7-57

Nº d'ordre

Désignation

planche 10 côté S N° 103 souche 1 2 3 4 VASSAL

- Grosse 1 Moyenne (2) Petite 3.
- Lâche 4 Moyenne 5 Compacte 6
- A pédoncule non visible 7 visible 8 long 9.
- A pédoncule herbacé () mi-aoûté 2 aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 - irrégulière 8
- De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 sphéroïde () ellipsoïde 2 cvoïde 3 tronccvoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 non persistant 2)
- A section transversale : régulière (3) irrégulière 4 côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7)
- A jus incolore (1) coloré 2.
- A peau fine 3 moyenne @ épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8.
- A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 🗇 rouge 8 irrégulière 9.
- A bourrelet : évident () peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 moyen (5) long 6.
- A pinceau : coloré 8 non coloré 9
- De séparation facile (égreneuse) 1 difficile 2.

```
Dénomination .... Lp. ....
 Planche ........ côté ...... Rang 10.3... souche 1-2-3-45)
                             Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
 Sarment
              : grêle (1), fort (2)
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
 Ecorca
Section transversale: circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                  autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
    н
              : entièrement (1) partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds
              : aplatis (1), effacés (2), globaleux (3), saillants (4)
Mérithalle de longueur moyenne : ..... cms.
             : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
    11
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
Yeux
              : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron ((1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                      : saillant (1), effacé (2)
                      : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

Boniel 4.12.56

```
Nº d'ordre: .0.2430.1. Désignation: . Epinou. . .
       . . . . Vas. 10 5 103. Vign.
8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0-1-2-3.
. . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
15 - S.L.S. (forme)
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
            Direction : 1 - 2-3
            Forme : 4-5.
            Médiane/Base : 6-7-8.
```

Tinct 57

Formulaire de description 2/8

(floraison)

Année: 1938

Code clone: 01

Code cépage Nom cépage

Observateur: Lacombe

Emplacement: 3 R1486-30 1.

Bourgeonnement

oiv 001 forme : globuleuse 3 - demi-ouverte 5 - ouverte (7)

oiv 002 distribution pigmentation anthocyanique : absente(1)- en liseré 2 - partout 3

oiv 003 intensité pigmentation anthocyanique : nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 forte 7 - très forte 9.

oiv 004 densité poils couchés nulle ou très faible 1 - faible 1 moyenne 5 forte 7 - très forte 9 oiv 005 densité poils dressés nulle ou très faible (1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Jeunes feuilles

oiv 051 couleur face supérieure (4 premières seuilles) : verte 1 jaune 2 - plages bronzées ? cuivrées rougeâtre sur toute la surface(4) oiv 053 densité poils couchés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible 1 - faible 3

movenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 054 densité poils dressés entre nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible ? faible 3

movenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 055 densité poils couchés sur nervures (face inf. 4° feuille) nulle ou très faible 1 - faible (Dmovenne 5 - forte 7 - 11ès forte 9.

oiv 056 densité poils dressés sur nervures (face inf. 4° feuille) : nulle ou très faible ! faible ? moyenne(5)- forte 7 - très forte 9.

Vassal:

Jeunes feuilles du haut (3 premières)

Profil: étalées 1)- en gouttière 2 - autre 3

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 280 - moyenne 200 - très forte 201

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 299 - faible 202> moyenne 203 - très forte 204 Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible 1) - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Couleur face sup. : blanc 205 - fauve roux 200 - carminé 207 - liseré carminé 208 - jaune 209 plages bronzées ou cuivrées 210 - vertes 212 - autre 213.

(Dans le cas où la 1° feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° feuille détachée sera notée :)

Jeunes feuilles du bas (3 suivantes)

Profil: plan () - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Densité poils dressés face inf. : nulle ou très faible 284 - moyenne 215 - très forte 216.

Densité poils couchés face inf. : nulle ou très faible 285 - faible 223 - moyenne 224 - très forte 225

Densité poils dressés nervures face inf. : nulle ou très faible 282 - moyenne 275 - très forte 216. Densité poils couchés nervures face inf. : nulle ou très faible 283 - faible 2D - moyenne 218

très forte 219.

Densité poils dressés face sup. : nulle ou très faible (1)- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. Densité poils couchés face sup. : nulle ou très faible (1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 Couleur face sup. : blanc 226 - fauve roux 227 - carminé 228 - liseré carminé 229 - jaune 230 plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - vertes 233

Formulaire de description 3/8 (floraison)

Année : 1998 Code cépage':

38

Code clone of

Nom cépage : Espirou N

Observateur Lacombe

Emplacement 3 Re4 886.90

Rameau herbacé

oiv 006 port : érigé () - demi-érigé 3 - horizontal 5 - demi-retombant 7 - retombant 9

oiv 007 couleur face dorsale entrenoeuds verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 37

oiv 008 couleur face ventrale entrenoeuds verte 1 - verte à raies rouges 2 - roune 3

oiv 009 couleur face dorsale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges 2 - rouge 3)

oiv 010 couleur face ventrale noeuds : verte 1 - verte à raies rouges D - rouge 3

oiv 011 densité poils dressés noeuds : absence 1)- présence 1)

oiv 012 densité poils dressés entrenoeuds : absence 1 - présence 9.

oiv 013 densité poils couchés noeuds : nulle ou très faible 1 moyenne 5 - forte "

oiv 014 densité poils couchés entrenoeuds nulle ou très faible D-moyenne 5 forte 9

oiv 015 pigmentation authocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

oiv 015* pigmentation anthocyanique écailles des bourgeons : nulle ou très faible 1 - moyenne ? - forte ou très forte 3

oiv 016 distribution vrilles: discontinue (2 on moins) 1 - subcontinue on continue (3 on plus) 2 oiv 017 longueur vrilles: très courtes (<10cm) 1 - courtes (15cm) 3 - moyennes (20cm) 5 - longues (25cm) 7 - très longues (>30cm) 9.

Inflorescence

oiv 151 sexe de la fleur : mâle 1 - mâle à hermaphrodite 2 - hermaphrodite 3 - femelle à étamines érigées 4 - femelle à étamines reflexes 5.

oiv 152 niveau insertion 1º inflorescence : jusqu'au 4º noeud 1 - au-delà du 4º noeud 2,

oiv 153 nombre inflorescence/rameau : 1 ou moins 1,1 à deux 2 - 2,2 à trois 3 - plus de trois 4

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 - moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Surface du rameau herbacé : unie 1 - côtelée 2.

Villosité spéciale du rameau herbacé : aucune 288 et 289 - épines ou analogues 243 - poils massifs 244.

Couleur des vrilles verte 260 - jaune 261 - rouge 262 et 263.

Formulaire de description 4/8 (entre nouaison et véraison)

Année: 1938

Code clone: 02

Observateur

Code cépage : 0208

Nom cépage Enfarine N Emplacement: 2 R4 176-80

L. R33 MM MS

Feuille adulte

oiv 065 taille: très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 grande 7 - très grande 9. oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3 - orbiculaire 4 - réniforme 5 oiv 068 nombre de lobes : feuille entière 1 - trois 2) cinq 3 - sept 4 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert foncé (7) oiv 070 pigmentation anthocyanique nervures face supérieure limbe : nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation(3)- rouge après première bifurcation 4 oiv 071 pigm. antho. nerv. face inf. limbe: nulle 1 - point pétiolaire rouge 2 - rouge jusque première bifurcation(3)- rouge après première bifurcation 4.

oiv 072 gaufrure limbe (entre nervures II et III) : absente présente 9. oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I et II) : absente présente 9 oiv 074 profil: plan D- en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 oiv 075 cloqure face supérieure limbe : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5)- forte 7 très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3)movenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7)- très forte 9.) oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 movenne 5 - forte 7 - très forte 9) oiv 087* densité poils dressés face inférieure : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9) oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 12- présente 9. oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente 1) présente 9

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane : beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 plus long 7 - beaucoup plus long 9.

Densité poils couchés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

Densité poils dressés limbe face supérieure : nulle ou très faible 1) faible 3 - moyenne 5 - forte 7 très forte 9.

Couleur du pétiole : vert 178 - partiellement coloré (77) - coloré 176

Formulaire de description 5/8

(maturité)

1998 Année:

Code cépage : 028 Nom cépage : Enfarine N

Code clone: 92

Observateur

Emplacement: 3 R4 A76.80 L. R33 sur. 115

Grappe

oiv 202 longueur: très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3 - moyenne (15-20cm) 5- longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3 - moyenne (10-15cm) 5 - large (15-

20cm) 7 - très large (>20cm) 9.

oiv 204 compacité: très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3- moyen (4-7cm) 5 - long (7-

10cm) 7 - très long (>10cm) 9. oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement (1) moitié 5 - plus de la moitié 7. a ressi

oiv 208* forme : cylindrique(1)- conique ou pyramidale 2. oiv 209* présence d'un aileron : absent 1 - une aile 2 deux ailes 3 - plus de deux ailes 4.

Baie

oiv 220 longueur: très courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 3 - longue

(20-26mm) 7 - très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5)- large (20-

26mm) 7 - très large (>26mm) 9.

oiv 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3.

oiv 223 forme : aplatie 1 - arrondie 2 - elliptique 3) ovoïde 4 - troncovoïde 5 - obovoïde 6 -

cylindrique 7 - arquée 8.

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1 - rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6)

oiv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2

oiv 227 pruine: nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 228 épaisseur pellicule: très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - très épaisse 9

oiv 229 ombilic: peu apparent 1)- apparent 2

oiv 230* coloration de la pulpe : non colorée 1 colorée 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée 1 coloration faible 3 - coloration moyenne 5 forte coloration 7 - très forte coloration 9

oiv 232 succulence pulpe : peu juteuse 1 - juteuse 2)

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9

oiv 236 saveur : aucune 1) goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5.

oiv 236* saveur : aucune 1 goût muscat 2 - goût foxé 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm)(3) moyen (8-12mm) 5 - long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

oiv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5 - difficile 7 - très difficile 9. oiv 241 présence de pépins : absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents (3)

oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9. oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins : absentes 1 - présentes 2.

Formulaire de description 6/8

(après chute des feuilles)

Année : 1198

Code cépage : 0208

Code clone : 02

Nom cépage : Enfarme N

Observateur

Emplacement: 3 R4 x 76-80 L. R33 x M_ M5

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire(1 - elliptique(3)- aplatie 5

oiv 102 surface : unie (1)- côtelée 2 - striée /3.

oiv 103 couleur générale : jaune (1)- brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes 1)- présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence D- présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds : absence D- présence 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm)(3)- moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm)(3) moyen (11mm)(5 - grand

(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens/2 / saillants 3

Formulaire de description 6 / 8 (après chute des feuilles)

Année : 2008 GrapGene06 Observateur : TD

Code cépage : 243 Code introduction : 243Mtp1
Nom introduction : Epinou Emplacement : Vass3R14s086-090

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée 3)

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 lenticelles : absentes 1 - présentes 9.

oiv 105 densité des poils dressés des nœuds : absence 3 présence 9.

oiv 106 densité des poils dressés des entrenœuds : absence 1 - présence 9.

oiv 351 vigueur * : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 352 croissance prompts-bourgeons : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 -

longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

Valeur absolue : 80 -

oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) 5 -

grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Suppléments pour Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 aptitude à la rhizogenèse : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal:

Noeuds: aplatis 1 - moyens 2 - saillants 3.

Pruine sur sarment : absence 1 - partiellement présente 2 - présente 3.

^{*} voir également le formulaire 1/8 « phénologie et vigueur »

Formulaire de description 7/8

(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

Année

Code clone: 01

Observateurs

Lacombe

Code cépage Nom cépage : 0243 EPINOU N

Emplacement: 3R14286-30

Feuille d'herbier

oiv 076 forme des dents : côtés concaves 1 - côtés rectilignes 2 - mélange notation 2 et 4 : 3 - côtés

convexes 4 - un côté concave, un côté convexe 5.

oiv 077 taille des dents : très petites 1 - petites 3 - moyennes(5) - grandes 7 - très grandes 9. oiv 078 rapport longueur/largeur dents: très courtes 1 - courtes 3 - moyennes(5) - longues 7 - très

longues 9.

oiv 079 ouverture sinus pétiolaire : très ouvert 1 - ouvert(2) - peu ouvert 3 - fermé 4 - lobes chevauchants 5 - lobes très chevauchants 6.

oiv 080 forme base sinus pétiolaire : en U(1)- en accolade 2 - en V 3.

oiv 0811 dents sur bord sinus pétiolaire : absence (1)- présence assez fréquente 1 ou 2 dents 2.

oiv 0812 sinus pétiolaire dégarni : absence ①- présence fréquente sur un côté 2 - présence

fréquente sur deux côtés 3.

oiv 082 ouverture sinus latéraux supérieurs : absence sinus 1 - ouvert 2- fermé 3- lobes chevauchants 4.

oiv 0831 forme base sinus latéraux supérieurs : en U(1) - en accolade 2 - en V(3).

oiv 0832 présence dent fond sinus latéraux supérieurs : absence 1) - présence fréquente 2.

Mesures ampélométriques sur feuille d'herbier

oiv 601 longueur nervure N1: très courte (<75mm) 1 - courte (105mm) 3 - moyenne (135mm) 5 -

Valeur absolue (en mm): 102 longue (165mm) 7 - très longue (>195mm) 9.

oiv 602 longueur nervure N2: très courte (<65mm) 1 - courte (85mm) 3 - moyenne (105mm) 5 -

Valeur absolue (en mm): . 89 longue (125mm) 7 - très longue (>145mm) 9.

oiv 603 longueur nervure N3: très courte (<35mm) 1 - courte (55mm) 3 - moyenne (75mm) 5 -

Valeur absolue (en mm): 65 longue (95mm) 7 - très longue (>115mm) 9.

oiv 604 longueur nervure N4: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 -

Valeur absolue (en mm): 42 longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9.

oiv 605 distance entre point pétiolaire et sinus supérieur (S1) : très courte (<3cm) 1 - courte

(5cm) 3 - moyenne (7cm) 5 - longue (9cm) 7 - très longue (>11cm) 9. Valeur absolue (en mm): 5,2

oiv 606 distance entre point pétiolaire et sinus inférieur (S2) : très courte (<3cm) 1 - courte

(4,5cm) 3 - moyenne (6cm) 5 - longue (7,5cm) 7 - très longue (>9cm) 9. Valeur absolue (en mm): 5,4

oiv 607 angle entre N1 et N2 mesuré à la 1° bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7

- très grand 9. Valeur absolue (en °): 58

oiv 608 angle entre N2 et N3 mesuré à la 1º bifurcation : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7

- très grand 9. Valeur absolue (en°): 54

oiv 609 angle entre N3 et N4: très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9.

Valeur absolue (en °): 56

oiv 610 angle entre N3 et la tangente entre le point pétiolaire et l'extrémité N5 : très petit 1 -

Valeur absolue (en °): 44 petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9.

oiv 611 largeur de la feuille : très étroite (<60m) 1 - étroite (100m) 3 - moyenne (140m) 5 - large

Valeur absolue (en mm): 13,6 cm (18mm) 7 - très large (>22mm) 9.

oiv 612 longueur de la dent N2 : très courte (<6mm) 1 - courte (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -

Valeur absolue (en mm): 6,5 longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9.

Formulaire de description 7/8 (suite)

(herbier, collecte entre nouaison et véraison)

oiv 613 largeur de la dent N2 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -Valeur absolue (en mm): 9 large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. oiv 614 longueur de la dent N4 : très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -Valeur absolue (en mm): 6 longue (18mm) 7 - très longue (>22mm) 9. oiv 615 largeur de la dent N4: très étroite (<6mm) 1 - étroite (10mm) 3 - moyenne (14mm) 5 -Valeur absolue (en mm): 9 large (18mm) 7 - très large (>22mm) 9. oiv 616 nbre de dents entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très petit 1 - petit 3 - moyen 5 - grand 7 - très grand 9. Valeur absolue : 🕺 oiv 617 distance entre extrémité N2 et extrémité de la 1° nervure secondaire de N2 : très courte Valeur absolue (en mm): 4,5 1 - courte 3 - moyenne 5 - longue 7 - très longue 9. oiv 066.4* longueur nervure N5: très courte (<15mm) 1 - courte (25mm) 3 - moyenne (35mm) 5 -Valeur absolue (en mm): 17 longue (45mm) 7 - très longue (>55mm) 9. oiv 066.5* distance entre point pétiolaire et départ N4 : très courte (<4mm) 1 - courte (8mm) 3 moyenne (12mm) 5 - longue (16mm) 7 - très longue (>20mm) 9. Valeur absolue (en mm) : 8 oiv 079.1* ouverture/superposition du sinus pétiolaire : très ouvert (<-35mm) 1 ouvert (-15mm) 3 - fermé (-5mm) 5 - chevauchant (+25mm) 7 - très chevauchant (>+45mm) 9 Valeur absolue (en mm): 3

Vassal:

Angle du lobe terminal : faible (<90°) 45 - moyen (=90°) 46 - grand (>90°) 47.

Formulaire de description 8bis/8

(maturité)

Année: 1998

Observateur: D- Loisel

Code cépage Nom cépage

Code clone:

Emplacement

Récolte

oiv 502 poids d'une grappe : très faible (<100g) 1 - faible (200g) 3 - moyen (400g) 5 -

élevé (800g) 7 - très élevé (>1200g) 9. Valeur absolue (en g)

oiv 503 poids d'une baie : très faible (1g) 1 - faible (2g) 3 - moyen (4g) 5 - élevé (8g) 7 - très élevé

Valeur absolue (en g)

oiv 504 rendement en kg/ha: très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Valeur absolue:

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (<65) 3 - moyen (65-75) 5 - élevé (>75) 7.

oiv 505 teneur en sucre du moût : très faible (<13%) 1 - faible (15%) 3 - moyen (18%) 5 - élevé

Valeur absolue (en %): (21%) 7 - très élevé (>24%) 9.

oiv 506 acidité totale du moût : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevée 9.

Valeur absolue (en g H2SO4/I)

oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9.

oiv 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pépins secs) : très faible (<10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (>65mg) 9.

Vassal:

	NOM: Enfairné nois	EMPLACEMENT: 3R4 p76 80
Vendange	Date: 2/olg/98 Nombre de souches récoltées: 1 Poids total de la vendange: 2,360 Kg Nombre total de grappes: 9 Rendement à l'hectare: 10,6 T = (poids total / nbr souches) x 4500 Pourriture (%): 5 % Couleur épiderme: non Saveur: sans saveur	Poids d'une grappe (oiv 502): 262 g Poids d'une baie (oiv 503): 3,02 g
Pressurage	Rendement en jus (ml / 100 g baies) (oiv 233): Indice réfractométrique (oiv 505): 20,4 Acidité moût (g H2SO4/l) (oiv 506): 5,8 pH du moût: 3,58	
Pépins	Poids de 100 pépins secs (g): 3,40 longueur des pépins (mm) (oiv 242): 7,1	Poids d'un pépin (oiv 243): 0,0340 % je puis Mun = 16,6 %